480000 500000 520000 540000 560000 580000

7500000 7480000 7460000 7440000 7420000

Areias
Silveiras
São José do Barreiro
Arapeí
Bananal
Angra dos Reis
Cunha
Paraty
Ubatuba
OCEANO ATLÂNTICO

LEGENDA

- Corpos d'água
- CX11: CAMBISSOLOS HÁPLICOS Distróficos textura argilosa e média fase não rochosa e rochosa + LATOSSOLOS VERMELHO-AMARELOS Distrófico textura argilosa
- CX12: CAMBISSOLOS HÁPLICOS Distróficos textura média e argilosa + LATOSSOLOS VERMELHO-AMARELOS Distróficos textura argilosa ambos com horizonte A moderado e proeminente
- CX17: CAMBISSOLOS HÁPLICOS Tb Distróficos A moderado textura argilosa ou média + Afloramento rochoso
- CX19: CAMBISSOLOS HÁPLICOS Tb Distróficos, A moderado textura argilosa ou média + LATOSSOLOS VERMELHO-AMARELOS Distrófico A moderado textura argilosa
- CX4: CAMBISSOLOS HÁPLICOS Tb Distróficos A proeminente e moderado + CAMBISSOLOS HÚMICOS Tb Distrófico ambos textura média e argilosa
- CX5: CAMBISSOLOS HÁPLICOS Tb Distróficos, A moderado textura argilosa ou média + CAMBISSOLOS HÚMICOS Tb, A moderado textura argilosa ou média, fase rochosa e não rochosa
- CX7: CAMBISSOLOS HÁPLICOS Tb Distróficos, A moderado textura argilosa ou média + LATOSSOLOS VERMELHO-AMARELOS Distrófico A moderado textura muito argilosa
- CX8: CAMBISSOLOS HÁPLICOS Tb Distróficos, A proeminente ou moderado textura argilosa ou média + LATOSSOLOS VERMELHO-AMARELOS Distróficos, A proeminente ou moderado textura argilosa
- ES1: ESPODOSSOLOS FERROCÁRBICOS Órticos A proeminente e moderado textura arenosa + NEOSSOLOS QUARTIZARÊNICOS Órticos distróficos A moderado
- ES2: Associação complexa de ESPODOSSOLOS FERROCÁRBICOS Órticos A moderado + ESPODOSSOLOS FERROCÁRBICOS Hidromórficos hísticos ambos textura arenosa + ORGANOSSOLOS endotiomórficos + SOLOS DE MANGUE + GLEISSOLOS indiscriminados
- LVA26: LATOSSOLOS VERMELHO-AMARELOS Distrófico textura argilosa + LATOSSOLOS VERMELHO-AMARELOS Distróficos argissólicos textura argilosa
- LVA53: LATOSSOLOS VERMELHO-AMARELOS ÁLICO, A moderado textura argilosa + ARGISSOLOS VERMELHO-AMARELOS Tb, Distrófico, A moderado textura média/argilosa + CAMBISSOLOS HÁPLICOS Distrófico, A moderado textura argilosa ou média
- PVA41: ARGISSOLOS VERMELHO-AMARELOS Distrófico textura argilosa + CAMBISSOLOS HÁPLICOS Distróficos textura argilosa e média ambos A moderado
- RU1: NEOSSOLOS FLÚVICOS Distróficos A moderado textura argilosa e média relevo de várzea.

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
IBAMA
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
DIRETORIA DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E VIDA SILVESTRE

PARQUE NACIONAL DA SERRA DA BOCAINA

PLANO DE MANEJO

Figura 5.2.11

SOLOS

Localização:

N
W E
S

Escala: 1:200.000

2000 0 2000 4000 Metros

Julho de 2000

Convenções:

- Cursos d'água
- Rodovias Pavimentadas
- Rodovias não Pavimentadas
- Trilhas e Caminhos
- Limite Municipal
- Limite do Parque Nacional da Serra da Bocaina
- Zona de Amortecimento
- Orla marítima

Elaborado com base na Carta do IBGE (1974) e Levantamentos de Campo
Projeção Universal Tranversa de Mercator
ZONA 23
Datum Horizontal: Córrego Alegre

Elaboração:

ASSOCIAÇÃO PRÓ-BOCAINA

UNICAMP
Faculdade de Engenharia Civil
Departamento de Sanemento e Ambiente
Laboratório de Planejamento Ambiental